

Hälsoråd och vaccinationer för resenärer till Sydamerika



Länder som omfattas av dessa råd: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Galápagosöarna, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela..

Nedan följer specifika råd för resenärer till denna region. Din vaccinationsmottagning kan ge dig uppdaterade detaljer kring sjukdomspanoramata i just det land du ska besöka.

Vaccinationer

Vacciner som rekommenderas till alla resenärer

Grundskydd: Alla svenskar bör ha ett grundskydd mot **mässling**, **difteri**, **polio** och **stelkramp**. En utlandsresa ökar ofta risken för **mässling**, och skydd mot **stelkramp** gör att man slipper ta en dos vid skada under resan. Utbrott av **difteri** har förekommit på senare år i Venezuela, varför difteriskydd är extra viktigt vid resa dit.

Hepatit A är en virusinfektion i levern som smittar via mat och vatten. Risken för hepatit A är förhöjd i samtliga länder. Vaccination rekommenderas därför till samtliga resenärer över 1 års ålder. Kombination med hepatit B-vaccination kan övervägas vid långresor, upprepade resor och till särskilda riskgrupper (se nedan).

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



Ett besök på en vaccinationsmottagning kan också vara ett bra tillfälle att se över andra vaccinationer som kan rekommenderas i Sverige, t.ex. influensa, bältros och TBE.

Vacciner som rekommenderas till vissa resenärer

Nedanstående vacciner kan vara aktuella utifrån exakt resmål, hur länge du ska vara ute, om du tillhör en särskild riskgrupp eller om du kan tänkas vara särskilt riskutsatt. Ta kontakt med en vaccinationsmottagning i god tid före din resa för att diskutera just dina behov. Besök också sajten **Frisk på resan** för att se vad du kan göra mer för att skydda dig mot de olika infektionerna.

Chikungunyafeber och **denguefeber** är virusinfektioner som kan ge feber, utslag, led- och muskelvärk. Smittspridning av dessa myggöverförda virus-sjukdomar förekommer eller har tidigare förekommit i de allra flesta länder och områden i regionen främst under regnperioden, och utbrott kan förekomma.

Liksom för alla myggöverförda sjukdomar är det viktigt att **skydda sig mot myggbett** (se nedan) i områden med smitt-risk (framför allt under regnperioden). Myggorna som ger dessa sjukdomar är dag-aktiva och sticker mest tidigt på morgonen och på kvällen före skymningen. Vaccination kan vara aktuellt för vissa resenärer som planerar längre resor.

Då det finns en möjlig risk för svårare sjukdom efter vaccination hos personer som tidigare **inte** haft dengue bör vaccination av denna grupp endast ske vid längre resor, då man bedömer att nyttan överstiger den potentiella risken. Läs mer på **Frisk på resan** och diskutera just din situation med din vaccinationsmottagning.

ETEC Turistdiarré är den vanligaste sjukdomen du kan råka ut för vid resa till den här regionen. Du kan få ett visst skydd mot diarré orsakad av vissa *E.coli*-bakterier (ETEC) med det orala koleravaccinet Dukoral®. Diarré kan emellertid orsakas av ett stort antal smittämnen så det är viktigt att du följer råden om mat och dryck nedan för att ytterligare minska din risk.

Gula febern förekommer i hela eller delar av samtliga länder förutom Chile och Uruguay. Dessutom kan det finnas vaccinationskrav vid inresa om man tidigare befunnit sig i ett riskland. Vaccination mot gula febern rekommenderas till resenärer äldre än 9 månader som kommer att vistas i riskområden. Om din resa bara tar dig till ”riskfria” områden bör du inte vaccinera dig för ”säkerhets skull” då vaccinet också kan ha biverkningar, särskilt för personer äldre än 60 år. Vaccination mot gula febern ska inte ges till gravida annat än i yttersta nödfall. Ändra hellre dina resplaner. Enbart myggskydd kan i vissa lägen också vara att föredra. Diskutera med din vaccinationsmottagning.

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



Hepatit B är en allvarlig virusorsakad leverinfektion som smittar via blod och oskyddat sex. Risken är förhöjd i samtliga länder förutom Argentina, Chile, Uruguay och Paraguay och smittrisken ökar ju längre tid du befinner dig i landet. Vaccination kan vara aktuell vid längre resa, särskilt om du kan tänkas bli exponerad för blodsmitta eller sexuell smitta. Tänk på risken att råka ut för olyckor och behöva söka sjukvård med dålig hygienisk standard.

Meningokocksjukdom: Vaccination mot meningokocker är normalt inte aktuellt för resenärer, men vaccination kan övervägas till ungdomar som under längre tid (minst 1 månad) ska arbeta eller studera i landet i nära kontakt med andra ungdomar (kortare tid vid internationella festivaler, läger, etc).

Rabies: Uruguay är fri från rabies bland landlevande djur (men kan förekomma hos fladdermöss). I Chile förekommer rabies endast bland vilda djur. I övriga länder kan rabies finnas hos lokala hundar, men också förekomma hos andra tama och vilda djur.

Om du blir biten eller får djursaliv på huden i dessa länder (särskilt om du har eksem eller småsår) ska du omedelbart söka sjukvård då man kan vaccineras även efter att man blivit smittad. I vissa av länderna kan tillgången till rabiesvaccin vara osäker och vid resa dit kan det vara aktuellt att vaccinera dig inför resan. Din vaccinationscentral har uppdaterad information om dessa länder och områden. Vaccination kan också vara aktuell för små barn inför längre resa och till personer med riskyrken, t.ex. veterinärer.

Det finns en ökad risk för tuberkulos i befolkningen i Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru och Venezuela. Vid längre tids vistelse i dessa länder kan vaccination vara aktuell för barn, särskilt om de ska vistas när lokalbefolkningen, samt till tidigare ovaccinerad sjukvårdspersonal och biståndsarbetare som kan komma ha direktkontakt med tuberkulos-sjuka personer. Övriga vuxna har ingen säker nytta av vaccinet.

Tyfoidfieber: Risken för tyfoidfieber är låg bland resenärer, men vaccination kan vara aktuell vid längre vistelse i regionen, framför allt om du kommer att vistas nära lokalbefolkning i fattigare områden och lever primitivt. För gravida kvinnor, personer med nedsatt immunförsvar och andra kroniska sjukdomar kan vaccination vara motiverad även vid kortare resor. Diskutera med din vaccinationsmottagning.

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



Andra infektioner att vara observant på

Malaria: Argentina, Chile, Paraguay och Uruguay är malariafria. I Ecuador och Surinam är risken så låg att enbart myggskydd oftast är tillräckligt. I övriga länder kan myggskydd behöva kompletteras med läkemedelprofylax vid vistelse i riskområden. Ta kontakt med din vaccinationsmottagning i god tid för att diskutera just din resa, speciellt då du kan behöva starta profylaxen innan avresan. Gravida bör (av många anledningar) inte åka till **malariaområden**.

Zikavirusinfektion: Zikavirus förekommer eller har förekommit i hela regionen. Myggskydd rekommenderas, särskilt om man vistas nära vattendrag och bevattnade fält. Aedes-myggorna är dagaktiva och sticker mest tidigt på morgonen och på kvällen före skymningen.

Kvinnor som är, eller försöker bli, gravida bör avstå från resa till områden med zikavirus, p.g.a. risk för fosterskador vid en eventuell infektion. För gravida kvinnor som ändå väljer att resa är myggskydd extra viktigt. Övriga kvinnor i fertil ålder bör undvika oskyddat sex på resmålet och två månader efteråt. Män bör undvika oskyddat sex på resmålet och tre månader efteråt. Gravida kvinnor, oavsett resa, bör undvika oskyddat sex under hela graviditeten med en man som varit i ett riskland senaste tre månaderna.

Oropouchfeber har sedan 2023 rapporterats från Bolivia (utbrott främst i Amazonas), Brasilien (förekomst i stora delar av landet, utbrott främst i Amazonas), Colombia (utbrott främst i Amazonas), Ecuador (utbrott främst i Amazonas), Guyana (första fallen rapporterade 2024) och Peru (utbrott främst 2024) där sjukdomen främst förekommer under regnperioderna. Tidigare än 2023 har sjukdomen även rapporterats från Argentina och Franska Guyana. Då sjukdomen lätt förväxlas med andra myggöverförda virusinfektioner kan den sannolikt finnas odiagnostiserad i fler länder i regionen.

Gravida resenärer bör, p.g.a. risk för fosterskador, om möjligt undvika att resa till utbrottsområden, särskilt under regnperioden.

Andra mygg- och vektorburna infektioner: **Nilfeber (West Nile fever)** förekommer i hela regionen. **Leishmaniasis** kan förekomma i Bolivia, Brasilien, Colombia, Paraguay, Uruguay och Venezuela. **Chagas sjukdom** förekommer i stora delar av kontinenten. Se vidare på sjukdomssidorna. **Flodblindhet (onchocerciasis)** förekommer i vissa indianområden i Amazonas (Brasilien och Venezuela). Skydd mot myggor, knott och andra insekter rekommenderas såväl dagtid som på natten.

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



Sexuellt överförbara sjukdomar (STI): Prostitution är utbredd i området och olika könssjukdomar är även i befolkningen mycket vanligare än i Sverige. Alla tillfälliga sexuella förbindelser utgör en risk, och kondomanvändning och ”säkrare sex” är därför viktigt vid alla tillfälliga sexuella kontakter.

Hakmaskar förekommer i hela regionen. Du bör undvika att gå barfota på landsbygden där mark kan ha förorenats av mänsklig avföring.

För att inte smittas med **leptospiros** och **melioidos** bör du undvika direktkontakt med jord och vatten i sjöar och vatten drag (framför allt efter stora regn) samt täcka sår med vattentäta förband. Om du har varit i sådan kontakt bör du skyndsamt söka sjukvård om du inom 30 dagar insjuknar med feber. **Snäckfeber (schistosomiasis)** kan förekomma i områden i Brasilien, Surinam och Venezuela. Undvik även av denna anledning att vada och bada i sötvatten.

Övriga hälsoråd under resan

Trafik

Trafikolyckor är den allra största hälsorisken under resor. Risken för en olycka är 10 -100 gånger så stor som i Sverige. Dessutom är akutvården i många länder avsevärt sämre än hemma. Använd säkerhetsbälte och sitt gärna bak. Åk inte långa bussturer i mörker med uttröttade chaufförer. Viktigaste rådet överhuvudtaget inför resa till utvecklingsländer: **HYR ABSOLUT INTE MOTORCYKEL ELLER MOPED!!**

Mat och dryck

Frukt som du själv skalar med rena händer är i regel riskfria. Äter du bara genomstekt eller kokt mat som fortfarande är varm så är risken för diarré möjligen något mindre, men de bakterier som orsakar turistdiarré är så vanliga att de i praktiken är svåra att helt undvika även om du gör ditt bästa för att vara försiktig. Det lönar sig alltså inte att vara extremt försiktig. Eftersom nya intryck av mat och dryck för många är en viktig del av upplevelsen med att resa kan rådgivning om mat sammanfattas som: Ät bara sådant som ser gott ut, luktar gott, smakar gott och är nylagat! Undvik kalla rätter på bufféer, särskilt om maten kan antas ha legat framme länge.

Vatten som luktar klor brukar gå bra att dricka, men smakar inte gott och är inte absolut helt säkert. Undvik alltid vatten som förvarats i termosar på hotellrum så lång tid att det

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



inte längre är kylt. Butelj- eller burkdrycker med kvarvarande kolsyra brukar gå bra. Kokt vatten dricks enklast i form av te eller kaffe.

Diarrébehandling

Diarré behandlas i första hand med vätska: Sprite, Seven Up, Sodavatten, Coca Cola eller vätskeersättningsmedel. Välj en dryck som du tycker om. En struken tesked salt och 4 teskedar socker bör tillsättas per liter vatten eller te. Drink lite (en matsked) men ofta (varannan minut). Medicinskt kol har ingen effekt, "mjölksyrebakterier" marginell sådan. De flesta diarréattacker läker utan behandling på några dygn. Stoppande läkemedel (Dimor, Imodium Travello) kan användas, inte minst om du måste vara på resande fot. Max 2 tabletter 2 ggr dagligen i max 2 dygn rekommenderas till alla som är 12 år eller äldre med akut diarré. Antibiotika kan behövas om inte diarrén har upphört inom två dygn.

Skydd mot myggor och andra insekter

Använd myggmedel som innehåller DEET, picaridin eller citroneukalyptus (PMD) flera gånger varje dag för att skydda dig dagtid mot myggstick. Använd även myggmedel utomhus för att skydda dig mot myggstick på kvällen och nätter. Det bör alltid finnas myggnät för fönster och dörrar som står öppna dagtid om det saknas luft-konditionering. Myggnät över sängen bör helst vara impregnerat med ett medel som gör att myggorna undviker nätet.

Sol och bad

Resor till varma länder medför en ökad risk för sol- och värmerelaterade sjukdomar, inklusive solbrännskada och värmeslag. Värmeslag inträffar när kroppen inte kan reglera sin temperatur effektivt, vilket leder till en farligt hög kroppstemperatur som oftast överstiger 40 °C. Symtomen på värmeslag kan utvecklas snabbt och kan vara livshotande om de inte behandlas. De vanligaste symtomen inkluderar förhöjd kroppstemperatur, förvirring eller förändrat medvetande, svår huvudvärk, illamående och kräkningar, yrsel och svaghet, hjärtklappning, och torr hud, p.g.a. minskad svettproduktion. Obehandlad kan värmeslag leda till svåra kroppsskador och t.o.m. död.

För att förhindra sol- och värmeproblem bör du undvika direkt solexponering under de hetaste timmarna mitt på dagen, bära lätta, löst sittande, ljusa kläder, hatt med brett brätte och solglasögon med UV-skydd samt dricka mycket. Vid minsta symtom på värmeslag bör du omedelbart söka skugga, kyla ner kroppen genom att ta en kall dusch eller använda en blöt handduk, och dricka vätska. Använd solskyddsmedel med en hög solskyddsfaktor (SPF) – minst 30, men högre SPF (upp till 50+) ger ännu mer skydd. Det

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



är viktigt att applicera solskyddsmedlet generöst på alla exponerade hudområden minst 15 minuter före solexponering och att återapplicera varannan timme eller oftare vid svettning eller simning.

Bada inte i havet utan att fråga efter underströmmar. Respektera röd flagga (=badförbud) på stranden. Skickliga simmare löper större (!) risk. Maneter är inte ovanliga och måste undvikas med bred marginal. Sting från manetens fångstarmar kan till och med vara dödliga. Om du tänker dyka på semestern, läs gärna de mer detaljerade råden på **Frisk på resan**.

Graviditet och resa

Att resa kan vara mycket givande och det är många som ser graviditeten som en möjlighet till nya upplevelser innan småbarnsperioden. Reserelaterade tillstånd eller sjukdomar på många håll i världen medför dock både risk för mer allvarlig sjukdom hos den gravida kvinnan och graviditetskomplikationer – i värsta fall både och. Att resa under graviditeten kräver därför extra planering och försiktighet för att göra resan så givande, säker och riskfri som möjligt.

Även om resa under graviditet inte är helt riskfritt, innebär det inte att resan alltid måste ställas in. I många länder är sjukvården av väl så hög klass som i Sverige och med tillräckligt bra försäkring är du i trygga händer om något inträffar. Flera försäkringsbolag (kontrollera hemförsäkringen) ansvarar inte för graviditetskomplikationer som inträffar efter vecka 28 och många flygbolag har en övre gräns för resa vid graviditetsvecka 37.

Som gravid bör du dock inte åka till många av dessa länder av flera skäl:

1. Vissa infektionssjukdomar får ett svårare förlopp under graviditet (t.ex. malaria, listeriainfektion och amöbainfektion).
2. Vissa infektionssjukdomar innebär en ökad risk för fosterskador (t.ex. zika-virusinfektioner och toxoplasma).
3. Vissa infektionssjukdomar ökar risken för missfall.
4. Det finns en risk för att utsättas för fosterskadande läkemedel i onödan eftersom medvetenheten om vilka läkemedel som innebär risk för fostret är sämre.
5. Det finns också en liten risk för att drabbas av en sjukdom som måste behandlas med läkemedel som kan vara fosterskadande.
6. Sjukvården har sämre resurser vid eventuella graviditetskomplikationer inklusive missfall.

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



Ovanstående gäller alldeles särskilt om du som gravid har någon/några andra riskfaktorer. Om du är gravida och ändå flyger lång väg bör du vara uppe ur stolen och röra dig varje timme. Diskutera med din MVC eller vaccinationsmottagning.

Riskfyllda djurkontakter

Djurkontakt vid utlandsresa kan medföra stora hälsorisker i form av infektioner eller sårskador. Internationella resenärer träffar ofta på djur som antingen finns hemma, men som i en annan miljö på resmålet kan bete sig annorlunda än vad man är van vid, t.ex. hundar, katter och råttor, eller mer exotiska djur som man inte är van vid, såsom fladdermöss, apor, ormar, skorpioner och andra vilda djur.

Bett från vissa däggdjur som påträffas under utlandsresor (fladdermöss, katter, hundar, apor och gnagare) utgör en risk för allvarlig infektion. Dessa djur kan vara bärare av bakterier och virus som är farliga för människor utan att själva vara sjuka, och deras saliv kan vara så kraftigt förorenade med smittämnen att enbart salivkontakt är tillräcklig för smitta, t.ex. av rabies (se ovan), om man har ett småsår eller mindre rispa i huden.

Undvik att klappa eller mata obekanta djur, tama såväl som vilda. Detta gäller även djur i fångenskap (t.ex. viltrancher, djurparker), särskilt i områden där det förekommer rabies. Vid safari- och ekoresor kan man bli uppmuntrad att ha nära kontakt med djur, men måste då komma ihåg att vilda djur ofta har ett oförutsägbart beteende och kanske till och med förknippar människor med mat. Tänka på möjligheten av oväntade djurkontakter även när du rör dig i städer och byar, och gå inte nära husväggarna när du kommer till ett gathörn. Hundar, katter och apor vilar sig ofta under restaurangbord eller parkerade bilar. Om de blir störda eller skrämda kan de bita till eller rivas. En sådan försiktighet är särskilt viktig om man reser med barn.

Om du ska vandra i områden med mycket ormar är det bra att bära stövlar eller höga kängor samt byxor och långärmat. Vid vattenaktiviteter som bad, snorkling och dykning är det rekommenderat att ha badskor eller dykstövlar. Våtdräkt är också skyddande.

Höga höjder

Äventyrsturism som inkluderar bergsbestigningar och vandringar på höga höjder över är förenade med hälsorisker orsakade av syrebrist på grund av den tunnare luften. Vid 3 000 m över havet får man vid varje andetag i sig mindre än 70% syre jämfört med ett lika djupt andetag vid havsytan, vilket snabbt visar sig vid fysisk ansträngning. Vid vistelse på höjder högre än 2 500 m kan man få symtom av syrebristen – det man kallar för akut höjdsjuka, ett tillstånd som påminner om alkoholberusning. I värsta fall kan höjdsjukan fortsätta att utvecklas till lungödem (vätska i lungorna) och hjärnödem (svullnad av hjärnan). I dessa

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.



fall är den viktigaste åtgärden, som kan vara livräddande, att snabbt komma ner på lägre höjd

Risken för allvarlig höjdsjuka ökar ju högre höjd man vistas på, ju snabbare man nått denna höjd och ju längre tid man vistas där. Syrebristen är störst när man sover, så av denna anledning kan det vara bra att göra dagsturer på högre höjd, men sedan återvända längre ner för att sova.

Bästa sättet att förebygga höjdsjuka att stanna 2-3 dygn på 2400-3000 m höjd och sedan enbart stiga 300 m/dygn. Undvik extrem ansträngning. Sov på så låg höjd som möjligt. Ät täta men små måltider. Drick rikligt. Ett mildt urindrivande läkemedel (Diamox) kan vara av värde. OBS: Resenärer som har avancerad blodbrist, kärlekskramp, hjärtbesvär med nedsatt fysisk förmåga och /eller de som har nedsatt lungfunktion bör/skall undvika hög höjd. Individer med vissa ärftliga blodsjukdomar skall inte heller utsätta sig för hög höjd.

Informationen ovan är hämtad från **Frisk på Resan**, som är en del av **resemedicin.se**, Sveriges största oberoende sajt för medicinska expertråd om resemedicin och vaccinationer. Klicka på QR-koden till höger för att läsa mer om vaccinerna, sjukdomarna och andra reserisker samt få fler tips och råd för en frisk och problemfri resa.

