



SVAR IGÅR

Redaktör: Lars Rombo

Nr 215, utskrivet v 21 2015

Kära läsare!

En glädjande nyhet: Inte ett enda fall av polio har diagnosticerats i Afrika hittills under år 2015. Detta har nu lett till att WHO minskat kraven på extra doser av polio i flera länder.

Flera prenumeranter har efterlyst information om hur man rekvirerar vaccinationskortet med undantag från vaccination mot gula febern. Gör så här: Skriv ett brev till Reserådet, Strömkarlsvägen 53, 167 62 Bromma och skicka med ett frankerat svarskuvert så får du 20 st.

Folkhälsomyndigheten kommer efter sommaren att delta i en prövning av ett levande försvagat vaccin mot kikhosta som skall ges som nässpray. Spännande!

Två barnhistorier. Hurra!!

Ebba fem år vid påsktiden:

- Mamma, det är Ronja på TV! Efter en stund,
- Nej mamma det var inte Ronja utan Jesus!

Viggo nio år har fått ett mikroskop av morfar. Man samlar lite småkryp att kolla på.

-Vi måste ta dö på dom, men oblodigt så det inte kladdar.

Info från www.

Scandinavianbiopharma.se:

BCG-vaccin från Japan är tillgängligt via licens fr.o.m. 20 maj

Tuberculin PPD finns åter i lager

Tetanusvaccin SSI finns åter i lager fr.o.m. 20 maj

Fråga: Kvinna född -50 som enligt uppgift har myelom och haft två pneumokockinfektioner

under vintern. Hematologläkare har nu rekommenderat henne att fylla på sitt vaccinations-skydd mot pneumokocker. Vaccinerades för några år sedan, förmodligen med Pneumovax. Vad göra? Ge ytterligare en dos med Pneumovax? Prevenar13?

Svar: Myelompatienter tillhör den grupp som svarar sämst på Pneumovax. Ge henne en dos Prevenar 13 och fyll på med en dos Pneumovax om två månader. Kanske gör den andra dosen lite nytta trots allt.

Fråga: Läser i senaste Svar Igår att du tycker att man kan ge diTeki-booster/Boostrix oavsett om man nyligen fått diTe-booster. Hur bedömer du risk för kraftig lokalreaktion av tetanuskomponenten vid täta vaccinationstillfällen? Vi håller just nu på att ta fram riktlinjer för pertussisskydd till nyblivna föräldrar och sjukvårdspersonal så frågan är mycket aktuell för oss. Lokalreaktionen är ju inte direkt farlig, men ändå obehaglig. Fram till nu har vi avrått från Boostrix om man fått diTe-booster de senaste fem åren, men det kanske är överdriven försiktighet?

Svar: Detta är inte helt enkelt men jag stöder mig bland annat på CDC som har rekommendationen att ge en pertussisbooster till gravida och till sjukvårdspersonal oavsett tiden sedan förra stelkrampsdosen.

Fråga: En kvinna som kommer för Havrix 2 + Encepur dos 3. Det som hänt sedan hon var här sist är att hon börjat att ta Imurel för en hjärtmuskelinflammation. Hon vet inte hur länge hon ska fortsätta med detta preparat. Är det något speciellt jag behöver ta ställning till?

Svar: Jag skulle avvakta med vaccinerna i hopp om att hon kan sluta med Imurel. Effekten blir med all sannolikhet sämre. Måste hon ta hepatit A-vaccin just nu så ge henne. Inte farligt!

Infektionskliniken ❖❖ Mälarsjukhuset ❖❖ 631 88 ESKILSTUNA

❖❖ E-mail: svarigar@gmail.com ❖❖

❖❖ Redaktionsassistent: 016 - 10 35 40 ❖❖

❖❖ Vill du prenumerera? Gå in på www.reseradet.com. Klicka sen på "Beställ Reserådet" ❖❖

❖❖ Prenumerationsservice: reseradet@gmail.com ❖❖

Fråga: En läkare här på jobbet fick Hepatit B-vaccin i samband med sin utbildning 1990. Det har nu gått 25 år, ska hon ta en boosterdos?

Svar: Nej. Inte om hon fått tre doser intramuskulärt. (Tillägg: Vid några universitet fick medicinstudenterna intrakutan vaccination med något mindre säkert antikroppssvar).

Fråga: En kvinna 24 år ville inför sin semester-resa ta Havrix. Det visade sig vid senare dokumentation att hon hade fulldos Twinrix... vad händer och vad göra?

Svar: Om hon fick Havrix i onödan är ingen skada skedd mer än att hon betalat i onödan. Du behöver inte göra ngt alls.

Fråga: Har en liten kille 12 mån som ska åka till Dubai nu på onsdag i nästa vecka. Han har inte fått sitt 12 mån vaccin och inte blivit vacc mot MPR. Då han haft ett antal otiter de senaste månaderna och tempat har man inte vaccinerat honom. Nu är det så att han ånyo fått PC och tar sista dos på söndag. Vad gör jag? Min tanke är så att det kanske inte är så bra med ett levande vaccin på måndag när man slutat med PC på söndag. Möjligen ge Hep A. Infanrix hexa har han inte fått men det kan väl vänta?

Om han inte ska ha MPR nu, ska man då ge det i direkt anslutning till hemkomsten el vänta tills han är 18 mån?

Svar: Näja, Dubai är inget högriskområde men otit är inte bra när man flyger (tillägg: har inget med frågan att göra!). Han kan ta levande vaccin utan hänsyn till pc och du kan kombinera hur du vill...

Fråga: Har ett par i 25-årsåldern som ska resa till Kap Verde den 19/3 och mellanlanda på Kanarieöarna. 1 v vistelse på hotell, all inclusive. Hur ska jag göra? Kort om tid för Twinrix, ska jag snabbvaccinera med Twinrix eller bara ge Hepatit A-vaccin?

Svar: Bara ge hepatit A tycker jag.

Fråga: Har två svenska kvinnor födda -51 och -56. De jobbar i skola med många barn från andra länder, man har beställt PPD och BCG-

vaccination för dem. Jag tror att de fått BCG som barn, räcker inte det?

Svar: Har de fått en BCG är detta nog för livet.

Fråga: Visst är det väl ändrat sedan förra våren att påfyllnad av fästingvaccin skall ske oavsett ålder vart 5:e år, eller är jag helt ute och cyklar? Fästingbussen vaccinerar tydligen vart 3:e år.

Svar: Fästingbussen följer rekommendationen i FASS. Vi har istället 5 års intervall efter dos 4 (yngre än 60 år) resp dos 5 (60 år och äldre).

Fråga: Fick dos 1 MPR jan 2015 inför utlandsresa. Ska nu inte ut och resa. Hade du fyllt på nu eller avvaktat 5 år?

Svar: Jag hade väntat 5 år.

Fråga: Hur länge kan man dröja med att ge BCG efter PPD-reaktion? Med tanke på att BCG är restnoterat...

Svar: Tja, om PPD sattes utan särskild misstanke på TB-exposition och bara som ett krav före BCG så skulle jag nöja mig med att vänta tills BCG finns på plats igen...

Fråga: En kund ger sin dotter född 2011 Varilrix (dos 1) för att skydda sin yngre dotter som har cancer och tar cellgifter. När är det bäst för hans dotter att ta dos 2? Egentligen så vet jag att du förespråkar att ta dos 2 upp till ett år efter första dosen för att få ett långvarigt skydd men i detta fall då vi är så angelägna att barnet får ett snabbt och bra skydd, skall dos 2 ges tidigare?

Svar: Ge henne dos 2 redan efter 2 mån - jag håller med om vitsen med ett snabbt skydd i just detta fall.