



SVAR IGÅR

Redaktör: Lars Rombo

Nr 225, utskrivet v 47 2015

Kära läsare!

OBS. Veckans nummer är inte layoutat eller korrektläst – ha förbarmande med Svargår som inte hunnit med.....

Inför uppföljningskurserna brukar vi göra djupdykningar i ” våra ” respektive föreläsningssämnerna för grundkurserna. På min lott faller bland annat polio vilket gett mig ännu fler gråa hår de senaste veckorna (faktiskt bara gråa hår kvar). Det är rekommendationer som strider mot vaerandra och som inte är uppdaterade. Flera instanser har svårt att skilja på vilt virus och vaccinvirus som muterat lite vilket lägger lök på laxen. Nåja, vi får se vad auditorierna anser om Svarigårs aktuella förslag

Fråga: Vi har en gravid i 9:e veckan. När hon åker till Somalia (Mogadishu) är hon i v 11 (4 sept). Jag ville rekommendera Doxyferm men hon ska vara borta i 2 mån (så när hon kommer tillbaka är hon i v 19). Hon kan alltså ta medicinen i en vecka efter hemkomst, enligt dina tidigare rekommendationer. Hur gör jag då med de återstående 3 veckorna? Är det ok att skippa dem? Vi utgår ifrån att hon använder adekvat myggskydd.

Svar: Jag hoppas att jag inte har sagt att det räcker med doxy 1 vecka efter utresa. Doxy har ingen som helst effekt preerytrocytärt och halveringstiden är så kort att 4 veckor behövs. I Mogadishu är risken visserligen lägre men långt ifrån noll. Jag skulle ge henne doxy och sluta vecka 20 + söka sjukvård vid feber. Alternativt skulle de flesta följa upp med Lariam i fyra veckor = bäst variant om hon prövat förut och säkrast om man vill ge optimalt skydd.

Fråga: Jag har blivit uppringd av chefen för ett asylboende som vill vaccinera sin personal mot

TBC, han säger att personalen träffar personer som kan vara smittade och vill skydda sin personal. Ska vi ge personalen detta och har det effekt på vuxna? Har för mig att skyddseffekten varit bäst om man ger till barn.

Svar: Tveksam skyddseffekt bland vuxna men tänkbart om de inte är vaccinerade förut eftersom psykologi spelar roll (vi slutade 1976). Jag skulle själv inte bry mig om vaccin i samma läge...

Fråga: Jag går och funderar och hoppas att jag får ställa några frågor som jag går och grannar på. Vid genomgången mässling och vattkoppor får man ett så bra antikroppssvar(?), immun-svar(?) så att vid en graviditet går så mycket skydd över till barnet att man anser att det skyddar i cirka 6 månader. Hur är det vid vaccination av nämnda sjukdomar? Ger det ett så högt antikroppssvar att tillräckligt skydd går över för att räcka i 6 månader? Eller ska man befara att barnet bara har skydd i 3, 4, eller 5 månader?

Svar: Mässlingsantikroppar från mor skyddar nog i fem månader om mor haft mässling. Är hon vaccinerad räcker det kortare tid, kanske 3 månader. Vattkoppsvaccin till modern ger skydd till barnet något kortare tid men svårt att säga exakt.

Fråga: Hur är det? Kan det försvagade viruset i vattkoppsvaccinet ge sig på och bosätta sig i nervändar och resultera i bältros? Är det tillräckligt aktivt för det? För annars borde det ju vara omöjligt att få bältros om man är vattkoppsvaccinerad till skillnad från om man haft vattkoppor.”

Svar: Vattkoppsvaccinvirus etablerar sig också i dorsalganglier men ger mer sällan bältros än vilt virus. I en studie bland vaccinerade barn som fått bältros hade majoriteten fått bältros av en vild stam!

Infektionskliniken ❖❖ Mälarsjukhuset ❖❖ 631 88 ESKILSTUNA

❖❖ E-mail: svarigar@gmail.com ❖❖

❖❖ Redaktionsassistent: 016 - 10 35 40 ❖❖

❖❖ Vill du prenumerera? Gå in på www.reseradet.com. Klicka sen på "Beställ Reserådet" ❖❖

❖❖ Prenumerationsservice: reseradet@gmail.com ❖❖

Fråga: Jag har ett ärende som inte känns så enkelt, tyvärr har jag dessutom dålig information. Patienten är 65 år och ska resa till Etiopien under 4 månaders tid, reser i övermorgon. Patienten har varit där tidigare. På grund av språket och att jag precis kommit från semester har jag inte själv pratat med patienten utan vill bilda mig en uppfattning först. Resan är både i stad och landsbygd under 4 månader och jag antar att hon ska hälsa på släktingar. Hon har nedsatt njurfunktion med GFR 135. Jag kan se att hon tagit påfyllnad av grundskydd och Lariam år 2009. Det jag tänker att jag kan göra är att ifrågasätta om hon fått hepatit A-vaccin, annars ge det. Jag har Vivotif hemma att skicka med henne. Vågar man ge henne Lariam på att hon haft det tidigare?

Svar: Hepatit A-vaccin är OK om hon inte redan fått det. Det är bara en mindre del av Lariam som utsöndras i njuren och hon har ju ett hyfsat GFR och krea så det bör gå bra. Om hon inte väger mer än 60 kg är halv dos att föredra. Försök penetrera hennes resvägar - kanske behövs inte Lariam alls...

Fråga: Vi undrar hur du tänker om att BCG-vaccinera en 4 månaders flicka, hennes mamma kommer från Brasilien och de ska åka dit i december. Flickans morfar har tuberkulos och får behandling för detta och skall inte vara smittsam längre. På mottagningen har vi en flaska med vaccin kvar och har inbokade kunder till denna. Tycker du att vi skall ge denna unga flicka vaccin redan nu? Vi får inget besked om när det beräknas komma in mer vaccin.

Svar: OK att ge vaccin redan nu om flickan är frisk...

Fråga: En (1) dos Vivotif med utgången datum (april 2015) har getts i förrgård och fortsatts med nya doser idag och i övermorgon. Tror du att personen fått tillräckligt skydd eller ska en extra tablett ges om 5 dgr?

Svar: Allt talar för att det fungerar men formellt sett skall dosen räknas bort. I många länder inkl USA ger man fyra doser som standard...

Svar på förra månadens fall:

"Kvinna född -57 har fått två TBE-inj maj resp juni 2012. Nu vill hon komplettera. Måste hon få 2 inj i år och en tredje nästa vår eller 1 i år och en påfyllning nästa år och sedan efter 3 år?"

Svar: Hon är yngre än 60 år och behöver bara fylla på dos 3 nu och dos 4 om tre år

Fråga: Idag skedde ett misstag i samband med influensavaccinering. En patient fick av misstag förra årets vaccin, Fluarix, istället för årets. Förra årets och årets vaccin har helt olika stammar. Jag har varit i kontakt med företaget men inte fått några riktlinjer hur vi bör agera. Hur gör vi?

Svar: Ge en ny dos med årets stammar- Risken för ökad allergisk reaktion är låg och i flera länder får äldre redan större doser

Månadens fall: Fråga: Tänkte boosta en kvinna född -79 med Boostrix. Säger att när hon var liten så blev hon sjuk av kikhostekomponenten så man hoppade över det i tripplen. Vågar jag ge kikhostevaccin eller ska jag hoppa? Fullt frisk. Åker till Grekland 1 vecka.