



SVAR IGÅR

Redaktör: Lars Rombo

Nr 253, utskrivet v 6 2017

Kära läsare!

Glädjande nog är grundkursen i maj i Göteborg redan fulltecknad och antalet platser i juni i Stockholm minskar snabbt. Detta har lett till att vi också planerar en kurs i Stockholm 21-23 sept och en i Malmö 4-6 okt. Anmäl intresse på www.reseradet.com.

Intresset för att få intyg om undantag för gula febern-vaccin ökar stadigt. Nu är det sällan tomt i Reserådets brevlåda. Gör som vanligt, dvs skriv ett brev till Reserådet, Strömkarlsvägen 53, 167 62 Bromma. Lägg med din prenumerant-adress och ett frankerat svarskuvert så kommer 20 ex gratis i retur.

Att det rapporteras fall av gula febern i delstaten Sao Paulo i Brasilien betyder inte att det är risk i staden Sao Paulo. Märkligt nog har CDC i USA börjat rekommendera booster med gula febernvaccin för resenärer till riskområden i Brasilien om det har gått mer än 10 år sedan sist. Detta trots att man anser skyddet efter en dos livslångt. Tala om hjärnsläpp!

Fråga 1: Om patienten överreagerat mot PC eller haft urtikaria av någon orsak eller Quincke-ödem av någon som helst orsak tidigare, har man ökad risk att överreagera mot vacciner då?

Fråga 2: Enligt Medicinsk författningshandbok så står det att om man har en ökad risk för anafylaxi skall oxygen finnas på vaccinations-enheten. Se fråga 1.

Fråga 3: Fick i dagarna till mig att det bara är läkare som får administrera levande vacciner, stämmer det?

Fråga 4: Sälja Dukoral "över disk" av icke medicinsk personal, utan läkarordination, okej?

Svar 1: Om man har reagerat med anafylaxi utan känd orsak kan risken för vaccinreaktion vara ökad.

Svar 2: Håller med handboken - sådana patienter skall hänvisas till sjukhusbunden instans med resurser.

Svar 3: Nej.

Svar 4: Enligt apotek får man inte göra så men "alla" gör så ändå.

Fråga: Pat har tagit hepatit B-vaccin 3 stycken 1983-84. Nu ska pat till Sri Lanka. Behöver först och främst hepatit A-vaccin förstås men hur gör jag med B, den är ju över 30 år?? Vidare tog pat booster stelkramp 1978, 1991 och har sedan bara tagit en difteri 1991. Kan jag ge en DT booster eller??

Svar: Ingen indikation för hepatit B-vaccin till Sri Lanka där bara en låg andel av befolkningen är bärare och dessutom har din resenär fortfarande skydd. Booster mot difteri och tetanus OK eftersom det var för 25 år sedan förra dosen.

Fråga: Har en envis patient som är född -78 i Italien, fick där ingen MPR och är nu orolig för påssjuka, han har ringt mig flera gånger och vår läkare på VC har inget bra svar. Vad är det jag skall ge honom? Är det verkligen nödvändigt?

Svar: Ge honom MPR. Det är helt ofarligt om han har haft sjukdomen. Två doser med 5 års mellanrum.

Fråga: Har nu några patienter som tidigare fått 1 dos Pneumovax (för mellan 5-16 år sedan) som är riskgrupp (KOL) och som vi vill ska ha ett bra pneumokockskydd. Ger dem nu 1 dos Prevenar 13. Räcker detta eller ska vi boostra även med ytterligare 1 dos Pneumovax? När ska jag i så fall lägga andra dosen Pneumovax. Om 2 månader? Eller är det en fördel att avvakta och fylla på senare (5 år?) för att ha ett så långt skydd

Infektionskliniken ❖❖ Mälarsjukhuset ❖❖ 631 88 ESKILSTUNA

❖❖ E-mail: svarigar@gmail.com ❖❖

❖❖ Redaktionsassistent: 016 - 10 35 40 ❖❖

❖❖ Vill du prenumerera? Gå in på www.reseradet.com. Klicka sen på "Beställ Reserådet" ❖❖

❖❖ Prenumerationsservice: reseradet@gmail.com ❖❖

som möjligt? Dessa patienter är i åldersgrupp runt 65-70 års ålder.

Svar: Ge dos 2 av Pneumovax efter 2 mån. Håller med om att det finns fördelar med att vänta men tänk om de trillar av pinn innan dess :-). Tillägg: Dessa patienter hade redan fått en dos Pneumovax och borde inte rekommenderas fler doser om de inte tillhör en högriskgrupp vilket vi inte vet...

Fråga: Har en kvinna född -87 uppvuxen i Finland, som jag ser i hennes vaccinationskort har hon vaccinerats mot polio: 2 st doser -88, -89, -94, -99 och sedan en Boostrix polio 2012. Totalt sett 6 st doser polio. Var det oralt vaccin mot polio som användes 80- och 90-tal i Finland? Hon ska nu åka till Pakistan bl a och jag anser ju att hon har livslångt skydd mot polio men i vaccinationskortet från Finland har de skrivit 5-10 års skydd efter Boostrix polio (tagen 2012). När nästa booster?

Svar: 1. Man gav oralt vaccin i Finland. Med all sannolikhet är hon redan immun men eftersom det är Pakistan och hon har fått oralt vaccin rekommenderar jag gärna en extra dos.

Fråga: Jag har talat med en dam född 1949 som säger sig ha fått hästserum som vaccin mot stelkramp när hon var yngre, vet inte när. Hon önskar förnya sitt stelkrampsskydd men kommer ihåg att hennes mamma sagt till henne att hon vid vaccination måste säga att hon har fått hästserum.

Vad vet du om detta?

Svar: Hästserum är inte ett vaccin - det är en sorts gammaglobulin från hästar som inte alls har långtidseffekt men som kunde användas för helt ovaccinerade efter sårskada.

Fråga: Om kunden har mindre än 3 veckor på sig att vaccinera sig mot TBE (dvs tid finns ej för snabbvaccination). Nöjer du dig då med en dos eller ger du 2 med så långt intervall som möjligt?

Svar: Beror på risken. Man kan ge dag 0+7 om man vill = bättre än bara dag 0 men förmodligen inte lika bra som 0+30.

Fråga: Vi har av misstag glömt ställa in en förpackning Stamaril i kylskåp. Det har stått ute i rumstemperatur mellan kl. 16.00 igår till idag kl. 07.00. Håller det eller måste vi slänga det?

Svar: Om du inte har blandat till vaccinet så håller det 3 månader i rumstemperatur. Se info i Rese-rådet pärm 1.

Svar på månadens fall:

"En liten fundering så här på kvällskvisten, kommer inte ihåg hur vi kom överens om gula febern-vaccineringarna som är över 10 år... Vi diskuterade det på uppföljningskursen i Gbg. Nu skall en kvinna till Rwanda och hennes vaccinering har gått ut med en månad. Ska vi skriva ny bok för säkerhets skull eller??"

Svar: Jag skulle inte lita på livslångt skydd i Rwanda där myndigheterna verkar vara särskilt krävande. Gör antingen som Lasse Lindquist som skriver ett nytt intyg med annorlunda datum eller som Lasse Rombo som skriver ett intyg om undantag med texten "lifelong protection of person vaccinated" och häftar ihop detta med certifikatet.

Månadens fall:

En kvinna som har influensavaccinerat sig under flera år. Men när hon vaccinerade sig förra året så dagen efter förra vaccineringen känt att vänster hand, arm blivit svag och öm, bortdomnad. Det försvann efter cirka 20 min. Åkte på akuten och blev inlagd för strokemisstanke, det avfärdades och bedömdes som influensavaccinbiverkan. Kvinnan funderar nu om hon kan ta årets influensavaccin. Vad tycker du?