



## SVAR IGÅR

### Redaktör: Lars Rombo

Nr 269, utskrivet v 44 2017

**Kära läsare!**

**Intet är som väntans tider: Dags för uppföljningskurserna i vecka 45 och 46.**

**Pestepidemin på Madagaskar** fortsätter. Nu rapporteras 1300 fall med 8 % dödlighet! Omgivningarna runt huvudstaden värst drabbade. Måste vara ett elände för turistindustrin i landet!

**Tyvärr är Pneumovax** restat - sannolikt fram till årsskiftet.

**Fråga:** Familj med 5 personer tog Ixiaro 2013, 2 doser enligt schema, nästa gång tog de 2016. Vad är din rekommendation nu?

**Svar:** År 2026 blir bra.

**Fråga:** Hur ställer sig Reserådet till Folkhälsomyndigheten rekommendation om vaccination mot difteri och stelkramp (boostervaccin som grundvaccination till vuxna)?

**Svar:** Syftar du på kompletteringar av immigranter? Då har Lasse L och jag gjort som Norge i 5 år, dvs gett "barnvacciner" till vuxna. OBS att det står märkliga saker på sid 25 i samma dokument från FoHM. Att man skall börja om när man bara fått tre doser som spädbarn. Håller inte med, h

**Fråga:** Ett barn 1½ år har blivit vaccinerat mot MPR och BCG med 2 veckors mellanrum istället för 4 veckor. Har svårt att hitta ngt skrivet om vad följden kan bli och ev uppföljning.

**Svar:** Inga som helst följer av detta. Ingen uppföljning behövs. MPR sätter kortvarigt ned immunförsvaret mot andra levande vacciner, särskilt gula febern men anslagstiden för BCG är så lång att det inte spelar någon som helst roll om man gett MPR eller inte.

**Fråga:** Om vacciner har placerats längst inne i kylskåpet och har frusit till is, bör de kasseras?

**Svar:** Ja tyvärr.

**Fråga:** Baby 5 månader, ska vistas utomlands ett år inom kort, går det bra att ge MMR? Mamma önskar även Ixiaro, kan hon få det med tanke på babyns ålder?

**Svar:** Jag tycker att hon kan lugna sig lite. Aldrig MPR eller Ixiaro till yngre än 6 mån och inget land har yngre än 9 mån i nationella mässlingsprogram.

**Fråga:** Kvinna född -85, önskar vaccin mot HPV. Har ej vaccinerat någon mot detta innan. Är det OK att ge Gardasil 3 doser, eller är det att föredra Cervarix (eller var detta mer riktat mot kvinnor över 45 år?)

**Svar:** I första hand skulle jag välja Cervarix som ger högre titrar men vill hon ha kondylomskydd blir det Gardasil. Alltid 3 doser 0+2+6 oavsett preparat.

**Fråga:** Jag har en patient som ska lungtransplanteras när det går. Han är ordinerad diverse vaccinationer, bl a DiTeBooster. Den fick han senast 2006. Tycker du att jag ska ge den?

**Svar:** Vi räknar med 20 års skydd så det känns inte viktigt men det är ingenting som hindrar...

**Fråga:** Har en 60-årig man som står på Metotrexate p g a RA. Nu har han och frun bokat och betalat en resa till Kenya med 3 nätter i Masai Mara. Jag kan ju inte ge Stamaril. Hur stor är risken där? Han kan väl inte åka?

**Svar:** Masai Mara är inte absolut riskfritt men så vitt jag vet pågår ingen epidemi just nu. Om han tar mindre än 0,4 mg/kg per vecka (vilket han tydligen gör), anses immunsuppressionen vara låg i USA och då skulle man kunna ge GF-vaccin. I ärlighetens namn skulle jag ändå avråda i första hand eftersom det är så kort tid. Tillägg: Mitt svar står jag för och ser det som en

Infektionskliniken ♦♦ Mälarsjukhuset ♦♦ 631 88 ESKILSTUNA

♦♦ E-mail: svarigar@gmail.com ♦♦

♦♦ Redaktionsassistent: 016 - 10 35 40 ♦♦

♦♦ Vill du prenumerera? Gå in på [www.reseradet.com](http://www.reseradet.com). Klicka sen på "Beställ Reserådet" ♦♦

♦♦ Prenumerationsservice: [reseradet@gmail.com](mailto:reseradet@gmail.com) ♦♦

avvägning mellan risk med vaccin och nytta. Dock tror jag att de flesta skulle ge vaccin eller helt avråda från resa och det är förstås inte fel.

**Fråga:** Hur många doser rekommenderas idag av Twinrix efter att man gett 3 st doser men ej erhållit tillräckligt med skyddande nivåer för B?

**Svar:** Om det är en riskgrupp för hepatit B skulle jag rekommendera Fendrix + titerkoll en månad. I annat fall Engerix med samma koll.

**Fråga:** Vi har några patienter som efter benmärgstransplantation påbörjat grundvaccinering med rent tetanus- och difterivaccin. Efter att difterivaccin inte gått att få tag i så undrar vi nu hur vi gör med de som fått 2 doser difterivaccin, kan man ge något av kombinationsvaccinerna istället??

**Svar:** När det gäller benmärgstransplantationer förstår jag inte varför man skall ge monovalenta vacciner. Detta är ju ett guldsläge för kombinationsvaccin som vi använder till barn.

**Fråga:** En flicka som är född -03 har delat upp sina vaccinationer och fått polio nr 3 senast 110511. Difteri x 3 senast 090423, tetanus x 3 senast 070417. Hon har ej fått pertussis. MPR nr 1 nu. Nästa år ska hon ju egentligen ha en påfyllning med difteri, tetanus och pertussis. Hur går jag tillväga?? Ska jag ge separat polio och difteri + stelkramp nu?? Nästa år bör hon ju ej få pertussisdelen?? Klurigt när vaccinationerna delas upp.

**Svar:** Gör det enkelt och ge henne en dos Infanrix polio som dos 4. Om föräldrarna vill dela upp skulle jag hänvisa till privat vaccinationscentral - det är inte din sak tycker jag. Dessutom blir det tokigt på många sätt eftersom alla vacciner inte finns att få tag i som monovalenta - och barnet får onödigt mycket aluminiumhydroxid.

**Fråga:** Hur är det nu med fysisk aktivitet samma dag som vaccination? Jag har läst i ngn bok från Apoteket att det är till fördel för vaccinets effekt att ta det lugnt samma dag som man vaccinerats. Dock har jag ett svagt minne av att du sagt motsatsen, nämligen att det kan

var till fördel för vaccinets effekt att träna samma dag som man vaccinerats. Vad är rätt?

**Svar:** Att det är en fördel att röra på sig och motionera samma kväll.

**Fråga:** Barn 9 år som fick Twinrix vuxen (i stället för Ambirix) och som vi hade tänkt följa upp med andra dos Twinrix vuxen efter 6-12 mån men som 7 månader efter första dos, på annan mottagning, fick påfyllnad med en dos Twinrix barn. Hur tycker du att vi ska vidare? En ny dos Twinrix barn efter 6 mån?

**Svar:** Ja, så får det bli.

**Fråga:** Jag har en kund som har haft ett fast förhållande i 11 år. Innan hon träffade honom hade hon gjort cellprovtagning som inte visade något tecken på HPV. För ett år sedan gjorde hon cellprovtagning som visade att hon hade HPV. Kan det sitta vilande i kroppen i så många år? Hur kommer det sig att hon inte hade tecken på HPV första gången?

**Svar:** Hon är antingen smittad senare eller också var provtagningen för 11 år sedan mindre känslig (vilket är sant). Du kan ha HPV "hur länge som helst" om du har otur.

**Fråga:** En flicka född 2005 har vaccinerats enligt följande: 2013 en dos Havrix, två doser Engerix-B, 2015 en dos Twinrix. Står i patientens journal att detta valdes på grund av att flickan är stickrädd. Vill bara förse mig om att detta är okej och att hon har fullgott skydd?

**Svar:** Tja, inte riktigt bra eftersom hon bara fått en halv dos hepatit A när hon fick Twinrix. Räcker nog för det mesta men garantier får du inte...