



SVAR IGÅR

Redaktör: Lars Rombo

Nr 292, utskrivet v 46 2018

Kära läsare!

Dags igen med ett utskick som också innehåller uppdaterade malariarekommendationer för ett fåtal länder som bilaga. Svar Igår kommer att använda resten av hösten till en komplett revision av rekommendation för malaria i ljuset av att risken minskar successivt i många länder.

Och så önskar vi alla våra prenumeranter välkomna till den nya versionen av vår hemsida! Ni hittar den på www.reseradet.com/nysajt Bifogat med detta Svar igår finns en instruktion för att komma igång med den nya hemsidan. Nyheter är bl.a en betydligt mer lättläst och funktionell visning av alla dokument och länder samt direkt åtkomst till malariakarta och gula febernkarta för det land man sökt på.

Vi kommer under en period att ha båda våra hemsidor aktiva men målet är att avveckla vår nuvarande hemsida så börja gärna använda den nya redan nu.

Välkommen in på ett besök!

Fråga: Jag önskar hjälp med råd för en kille född -85 som ska till Nepal i mitten av november. Han ska vistas i norra delen, vandra samt vistas bland lokalbefolkning på landsbygd under en månads tid. Han har grundskydd med barn-vaccinationer. Tagit två doser Epaxal med sista 2005. Vi får väl tänka oss hepatit B, tyfoid, Dukoral. Tycker du att vi ska ge Menveo, jap encefalit, rabiesvaccin?

Svar: Inte säsong för JE så sent i norra Nepal. De andra två vaccinererna är aldrig fel...

Fråga: Jag har två patienter som ska resa till Kap Verde, födda -74 och -79. Anser du att de bör vaccineras mot mässling?

Svar: Ja med en dos – de bör ha fått en dos i skolan.

Fråga: Har en familj som ska åka till Brasilien, Rio de Janeiro och Buzios 14 dagar, de ska vara utmed kusten. Har du några synpunkter på Stamaril där?? Bör de vaccinera sig mot Gula febern med tanke på de epidemier som går.

Svar: Det är väl klokt att ge vaccin.

Fråga: Ser i Reserådet att EMLA inte ska användas före BCG-inj men vad gäller vid andra levande vaccin t ex vattkoppsvaccin?

Svar: Då är det sannolikt OK men hur mkt det hjälper kan man undra... Tillägg: Mitt svar syftar på subkutana eller intramuskulära injektioner där nyttan av EMLA är obetydlig.

Fråga: Familj som vaccinerade sig igår med Stamaril, hör nu av sig då mannen i familjen, frisk och utan medicin skriver att han fått guldfärgade fläckar i händerna (små). Inga andra symptom. Jag har inte sett någon bild men heller aldrig hört om denna åkomma. Finns den?

Svar: Aldrig hört talas om :-). Be honom komma förbi och visa upp!

Fråga: Vi har ett utbrott av kikhosta på en förskola och en kollega undrar om hennes gravida väninna, som väntas nedkomma om cirka 2 veckor, skall vaccinera sig?

Svar: Ja. Tillägg: Osannolikt att barnet hinner få så mkt antikroppar via placenta men mor får åtminstone visst skydd.

Fråga: Tjej som tog Vivotif-kapslar för drygt ett år sedan, nu ska hon resa igen. Behövs booster eller är det 3 år som gäller?

Svar: Nu gäller tre år.

Fråga: En kvinna ringde mig idag. Hon, hennes man och deras 4 barn kommer att bo i

Thailand, södra delen i stadsmiljö i 6 månader. Deras yngsta kommer bara vara 4 månader när de åker dit. Hon undrar över MPR. Info att man kan, om det krävs, ge det vid 6 månader. Sedan undrar hon även över Hepatit A. Deras barn har fått vad hon tror 2 doser men BVC har inte dokumenterat andra sprutan. Första sprutan fick de för några år sedan. Jag ger henne info om att det räcker med en spruta till, hon vill "börja om". Sedan en fundering kring rotavirusvaccinet som hon önskar att ge till den lille (som idag är 2 månader). Läser på Folkhälsomyndigheten att vissa landsting erbjuder detta. Västernorrland är dock inte ett av dem. Jag har även informerat henne om japansk encefalit samt tyfoidfeber.

Svar: I korthet: Jag skulle ge rotavirusvaccin före resan. I Thailand ger man inte MPR förrän vid 9 mån ålder och mässlingsrisken är låg. Samma sak gäller hepatit A där det dessutom är så att små barn sällan blir sjuka (fast de kan smitta när de kommer tillbaka till Sverige).

Fråga: Jag har en fråga om rabiesvaccinering. Det rör sig om en man som fått tre doser rabiesvaccin -09 men aldrig någon booster därefter. Nu blivit biten av en hund i Thailand 22/10 och där samma dag erhållit vaccin + immunoglobuliner. Får dos 2 (dag 3) av post-expositionsprofylaxen av mig idag (25/10). Med tanke på att han aldrig tagit någon booster ska man ge honom någon mer dos eller räcker de två doserna som man brukar rekommendera?

Svar: Det räcker med de två doser han har fått som PEP. Onödigt att han fick immunoglobulin men det var kanske inte känt om hans tidigare vaccindoser.

Fråga: Söker info ang malaria på Boa Vista på Kap Verdeöarna men hittar inget helt aktuellt. Vet du något?

Svar: Nej inget i höst. Gissar att risken är så låg att läkemedelsprofylax i regel inte behövs.

Fråga: Det var ett tag sedan jag fyllde i för Gula Febern men visst räknar jag fram tio dagar från dagens datum och skriver på "Certificate valid from" 181103, until 281102. Jag gav det idag.

Svar: Skriv inte until. Skriv istället "lifelong protection of person vaccinated". 10-dagars-regeln gäller fortfarande för inresa när skydd behövs av legala skäl.

Fråga: Vi har en familj med ett barn på 10 mån som skall åka till Nya Zeeland på semester i 3 veckor. Skall man vaccinera barnet för hepatit A eller hur skall vi tänka?

Svar: Jag skulle inte bry mig. Samma risker som i Sverige...

Fråga: Jag har en kvinna född -72 som tog två doser Twinrix 2003. Jag gav henne en dos igår. Frågan är nu om hon anses vara fullvaccinerad eller om jag skall börja om då det gått 15 år sedan dos 1 och 2?

Svar: Nu räcker det.

Svar på förra månadens fall:

"En BVC-sköterska behöver låna BCG-vaccin av oss. Vårt vaccin har utgångsdatum för två månader sedan. Hur skulle du göra? (eller vi rättare sagt). Använda det vi har eller beställa nytt? Vi får ofta kassera, då det är sällan vi har BCG-vaccineringar."

Svar: Två månader efter utgångsdatum talar allt för att det fungerar ändå och om jag skulle ge vaccin till mig själv eller anförvant så skulle jag inte tveka. Men nu är vi i ett annat läge och du bör kassera, tyvärr...

Månadens fall:

Schema för Ixiaro är ju de två första doserna dag 0 och 28 och numera godkänt att ge dag 0 och 7. Det går väl att ge andra dosen däremellan också, d v s 2 eller 3 veckor efter första dosen? Eller...?